نشرة للمرضى: تعليمات ختان الرضّع

قبل الإجراء

يُفضّل إرضاع الطفل قبل الإجراء. ويمكن إعطاؤه الحليب بالزجاجة أو اللهاية أثناء الإجراء عند الحاجة.

لا يلزم إعطاء الطفل Paracetamol قبل الإجراء. ومع ذلك، يمكنكم إعطاؤه جرعة من Paracetamol مناسبة لوزنه وعمره وفقًا لمعلومات المنتج قبل الإجراء. ويمكن إعطاؤها قبل الإجراء بـ 30 دقيقة. نحن لا نوصي بذلك بصورة روتينية؛ فالاختيار يعود إليكم.

وبالمثل، يمكن شراء مخدّرات موضعية مثل Emla أو Numit واستخدامها على منطقة الأعضاء التناسلية قبل الإجراء. نحن لا نوصي بذلك بصورة روتينية؛ فالاختيار يعود إليكم.

يرجى إبلاغ الطبيب قبل الإجراء إذا استخدمتم أيًا من المنتجات المذكورة أعلاه.

لا تعطوا الطفل أي Ibuprofen قبل الإجراء، لأن ذلك قد يزيد خطر النزيف. يرجى إبلاغنا إذا أعطيتم الطفل أي Ibuprofen قبل الإجراء، إذ قد يكون من الخطِر المضي في الإجراء في ذلك الوقت.

أثناء الإجراء

1. سيوضع طفلكم في مُثبّت لإبقائه في مكانه أثناء الإجراء. هذا المُثبّت لين ولا يسبّب أي أذى جسدي للطفل، لكن معظم الأطفال يبكون عند تقييد حركتهم ويستمرّون في البكاء طوال وجودهم فيه. وعادةً ما يتوقف الطفل عن البكاء فور إخراجه من المُثبّت.

2. لن يشعر الطفل بالألم بعد أن يعطيه الطبيب المخدّر الموضعي بالإبرة.

3. سنضع للطفل حفّاضة بعد الإجراء مع Vaseline كحاجز يمنع التصاقها بالسطح المكشوف للجرح.

العناية بعد العملية

1. يُفضّل عدم تحميم الطفل لمدة يومين (2)، والتعامل برفق مع موضع العملية. وذلك لمنع تحرّك الجهاز المستخدم في الختان من مكانه عن طريق الخطأ.

2 . يمكن استخدام المناديل المبلّلة لتنظيف المنطقة .

3 . إذا تلوّثت المنطقة بالبراز ، يمكن تنظيفها برفق بالماء والصابون .

4 . ينفصل الجهاز عادةً خلال 7 – 3 أيام . إذا حدث ذلك في وقت أبكر ، يرجى إبلاغنا .

5 . من الطبيعي وجود منطقة بنية داكنة أو بيضاء حول الحلقة . وستسقط هذه المنطقة أو تزول عند سقوط الحلقة أو خلال بضعة أيام من سقوطها .

6 . يرجى إبلاغنا إذا حدث أي مما يلي :

أ . تورّم غير معتاد .

ب . عدم سقوط الحلقة البلاستيكية خلال 8 أيام .

ج . انزلاق الحلقة إلى الخلف على جسم القضيب .

د . عدم حدوث الالتئام على النحو الذي وصفه الطبيب .

7 . يُعدّ النزيف الذي يتجاوز بقع الدم الصغيرة حالة طارئة . إذا حدث ذلك ، يرجى الاتصال بالدكتور Omair على الرقم 0421193675 . يمكنكم الاتصال بهذا الرقم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7) في الحالات الطارئة . إذا لم يردّ أحد على هذا الرقم و/أو تعذّر التواصل معنا ، يرجى طلب خدمات الطوارئ والاتصال بالرقم 000 أو طلب سيارة إسعاف .

8 . إذا لم تكن الحالة طارئة ، يرجى عدم الاتصال ، وإرسال رسالة نصية إلى الرقم تتضمّن بيانات المريض وتاريخ الجراحة . وفي معظم الحالات تكون صور موضع الجراحة مفيدة .

اعتبارات أخرى بعد العملية

1 . في الفترة اللاحقة للعملية ، نلاحظ لدى بعض الرضّع الذين خُتنوا عند الولادة أو في مراحل لاحقة تراكمًا كبيرًا للدهون في المنطقة فوق العانة . وقد ينطوي القضيب إلى داخل هذه الدهون . ويمكن إظهار القضيب بتحريك الدهون المحيطة به . وهذا ليس من المضاعفات ولا يدعو للقلق ؛ فهو يحدث بصورة طبيعية بسبب تشريح القضيب والدهون المحيطة به . وننصح بإظهار القضيب عند تغيير الحفّاضة لتنظيفه . وعادةً ما يفقد معظم الأولاد الدهون في هذه المنطقة عند بلوغ عمر 4 – 3 سنوات ، فلا يعود القضيب ينطوي إلى الداخل .

2 . إذا كانت لديكم أي مخاوف ، يرجى التواصل معنا .